


Istruzioni per l'uso

EURneffy spray nasale, soluzione in contenitore monodose adrenalina

Prima che si presenti la necessità di usarlo, acquisire familiarità con EURneffy, compreso quando e come deve essere usato.

EURneffy spray nasale



Seguire queste istruzioni solo quando si è pronti all'uso.

A



Estrarre EURneffy spray nasale dalla confezione.

Aprire la confezione per estrarre EURneffy spray nasale.

B



Tenere lo spray nasale come mostrato.

Tenere lo spray nasale con il pollice sulla parte inferiore dello stantuffo e un dito su ciascun lato del beccuccio.

- **Non tirare né spingere sullo stantuffo**
- **Non effettuare prove né tentativi di spruzzo; ogni spray nasale contiene una sola dose.**

C



Inserire la punta dello spray nasale in una narice fino a quando le dita tocchino il naso.

Tenere il beccuccio diritto all'interno del naso puntato verso la fronte.
Non inclinare lo spray nasale verso le pareti interne o esterne del naso.

D



Premere con forza lo stantuffo fino a farlo scattare in modo da erogare lo spruzzo nella narice.

Non inclinare lo spray nasale verso le pareti interne o esterne del naso.



Richiedere immediatamente assistenza medica di emergenza

Richiedere immediatamente assistenza medica di emergenza per sottoporre l'episodio anafilattico a un attento monitoraggio e nel caso in cui sia necessario un ulteriore trattamento.



Monitorare i sintomi del paziente



Se i sintomi continuano a peggiorare o si ripresentano dopo circa 10 minuti, o in caso di qualsiasi errore di somministrazione, somministrare una seconda dose utilizzando un nuovo spray nasale EURneffy nella STESSA narice della prima dose e richiedere subito assistenza medica di emergenza.

Se necessario, è consentito sdraiarsi con i piedi sollevati. Se tale posizione impedisce di respirare, è necessario stare seduti. I pazienti non coscienti devono essere collocati su un fianco in posizione di sicurezza. Se i sintomi non scompaiono, è necessario, se possibile, rimanere con un'altra persona fino all'arrivo dell'assistenza medica.